

專家：接種進度未理想宜擴範圍



在衛生署接種新冠疫苗指引下，相信有不少長者或被界定為「宜暫緩接種」的類別，以致疫苗接種名額未能用盡，也影響香港盡快達至七成人口接種疫苗、群體免疫的進度。

劉宇隆：為長者身邊人接種

劉宇隆昨日接受傳媒訪問時表示：「既然長者有擔心，我們就間接、用另一策略去保護長者，即為長者的身邊人接種疫苗。」

梁子超倡傳媒等納優先群組

呼吸系統專科醫生梁子超接受香港文匯報訪問時指出，不少市民對接種疫苗有誤解，也有長者在接種時可能感到緊張，致出現血壓升高、暈眩或嘔吐等神經反射反應。

梁子超認為，由於指引或令不少有長期病患的長者暫時放棄接種疫苗，政府可考慮擴大優先接種群組，讓更多高危組別如傳媒，甚至任何有意接種疫苗的市民皆可接種。


何栢良：製圖表增市民信心

對於接種疫苗後嚴重異常個案，港大感染及傳染病中心總監何栢良昨日表示，公眾要理解有「背景發病率」，即使沒有接種疫苗，部分人的病情仍會自然惡化或病發。

●香港文匯報記者 文森

冠心病煙民糖尿病患擬禁接種

衛生署最快今發指引 專家倡後生仔壯年組先打



接連有市民在接種新冠疫苗後不適或出現異常情況，一名70歲為長期病患的老婦昨日入院後離世，她死前9天曾接種科興疫苗。

由於她辭世與打針相隔多日，專家相信其死因與打針的關係微乎其微；另一有名「暈針」記錄的47歲男子，昨日在接種科興疫苗後不適送院。

●香港文匯報記者 高俊威



不少長者前往西灣河體育館接種疫苗。

暫不宜接種疫苗人士
●吸煙並懷疑患冠心病
●運動時出現氣促及胸口痛
●高血壓，即上壓長期超過160、下壓超過100
●患糖尿病，即血糖平均值長期超過10
●有甲狀腺問題
●患長期病，且正在調校藥物分量
資料來源：新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅

醫管局昨日向衛生署呈報接種疫苗後異常事件，一名本身患有高血壓及退化性膝關節炎的70歲老婦，昨日早上出現氣喘，中午在家中暈倒。

針後9天出事 或與疫苗無關

另一名67歲患有糖尿病、高血壓及高血脂症的老翁，昨日中午突然在旺角地鐵站暈倒，被送往廣華醫院。

這兩宗個案均在接種疫苗後9天出事，專家相信事件與注射疫苗的關聯極微。

不一定與疫苗使用有因果關係，但衛生署會在取得所有相關資料(包括第一宗個案的初步解剖報告)後，盡快交由新冠疫苗臨床事件評估專家委員會按世界衛生組織的算法流程，進行因果關係評估。

有「暈針」前科 中年漢針後暈

另外，昨日早上近10時，一名47歲男子在官浦體育館接種科興疫苗後，於休息區觀察期間感到頭暈。

病人對自己是否適合接種新冠疫苗存有各種疑慮，據了解政府最快今天會公布有關疫苗接種指引的詳情。

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅昨日接受電台訪問時透露，衛生署將發出指引，列出哪些人士暫時不應接種疫苗。

食物及衛生局副局長徐德義昨日在疫情記者會表示，目前累計已有約13.05萬名市民接種第一劑疫苗。

2021年第152號號外公告

預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例 強制檢測公告

本人現行使《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》(第599章，附屬法例J)(《規例》)第10(1)條所賦予的權力：

類別人士

- (I) 指明以下類別人士：
(a) 任何人士不論以何種身分(包括但不限於住客、訪客及工作人員)...

檢測的規定及程序

- (II) 規定每位屬上述類別的人士(見附註一)，按以下規定及程序，進行就2019冠狀病毒病的聚合酶連鎖反應核酸檢測(指明檢測)：
(a) 流動採樣站的檢測：
(i) 在2021年3月12日或之前，前往任何一間流動採樣站...

- (iii) 在2021年3月12日或之前，交回已採樣本的檢測樣本收集瓶至樣本收集包中有關資料列明的收集點；及
(iv) 保存載有檢測結果的電話短訊通知，並在訂明人員要求提供有關該人士進行指明檢測的資料時，提供有關電話短訊通知供其查核；
或
(e) 醫院管理局普通科門診診所的檢測：
(i) 在2021年3月12日或之前，在醫院管理局的普通科門診診所...

(III) 規定每位屬上述類別的人士，應在合理可行範圍內，採取適當個人防疫措施包括佩戴口罩及保持手部衛生，以及除為進行指明檢測外盡可能在確定檢測結果前留在其居住地點並避免外出；

《規例》第14(3)(b)條下指明的期間
(IV) 就上述類別人士，指明由2021年3月13日至4月11日的30日期間，為不遵從此公告的情況下，在《規例》下可發出強制檢測令的期間；

委任訂明人員
(V) 就本公告指明的類別的人士，委任醫療輔助隊隊員以及香港特別行政區政府所有公職人員執行《規例》下的職能(關於本公告下的規定者)；

附註一：
如果屬於上述第(I)部分中指明的類別人士曾之前於2021年3月8日至3月10日期間進行指明檢測，則無論是否遵從本公告中的規定而接受該指明檢測，均會獲視為已遵從本公告中的規定。

附註二：
各個流動採樣站的位置、開放時間及服務對象(如適用)載於 https://www.coronavirus.gov.hk/chi/early-testing.html。

附註三：
各個社區檢測中心的位置及開放時間載於 https://www.communitytest.gov.hk/hk/zh-hk/。

附註四：
派發樣本收集瓶的郵政局、普通科門診診所及港鐵站的地點和開放時間，以及樣本收集地點及時間載於 https://www.coronavirus.gov.hk/chi/early-testing.html。

附註五：
在《規例》下，衛生主任無委任便可執行關於強制檢測公告下的規定的職能。

2021年3月10日 食物及衛生局局長



觀塘曉光街體育館內，市民接受疫苗注射後即場休息30分鐘，觀察有否異常反應。

醫生：指引助挽回市民信心

衛生署最快今日公布接種疫苗指引，列明哪些人士暫時不適宜接種科興和復必泰兩款疫苗。

楊超發：醫生評估有據可循

西醫工會創會會長楊超發昨日接受香港文匯報訪問時表示，受早前長者接種疫苗後不適事件影響，目前私家診所中，約有兩成預約者暫緩接種。

生與接種者的信心，「醫生在評估市民是否適宜接種時能有據可循，可更詳細話界市民知(為何適宜)。

他認為，指引的操作性不成問題，「醫生查詢診所及公立醫院的病歷系統，例如指引中提及的心臟問題，醫生會查返有無記錄。

陳培光：對診所醫生有幫助

西醫工會流行病委員會主席陳培光昨晨在電台節目上表示，如果政府訂立準則，清晰指出什麼情況下不宜接種新冠疫苗。

所以未有指引前，診所醫生對打針好謹慎，接種前會小心評估預約者身體狀況，若認為身體情況較差，短期內引起突發情況機會較高。

他表示，若病人在診所接種疫苗後不適，甚至死亡，對私家醫生而言會「幾麻煩」，「大眾或會歸咎醫生，對醫生是大大壓力。」

●香港文匯報記者 文森

科興：接種兩劑保護效力達九成

香港文匯報訊(記者 文森)科興新冠疫苗迄今有約20個國家地區批准緊急使用，包括香港、印尼和土耳其等。

尹衛東在訪問中稱：「你打完兩針後，就一個月的時候是最高的保護水平。

之九十、八十這樣的保護率，我們正在研究半年的數據。」

盡快接種免危害公眾

由於市面已出現多款新冠疫苗，選擇多使市民眼花繚亂，尹衛東教市民挑選疫苗的考慮因素，「第一個，就是低風險情況下，就是說你發病風險很低的情況下，你可能優先選擇安全性，



尹衛東表示，接種兩劑科興疫苗保護效力最高達八九成。視頻截圖有安全性更良好的疫苗。但你在高風險情況下，你可能應該選擇高保護效果。」